Cadiz le 9 fev.er 1739

Employés

Vers Le mois D'avril 1725 je Jeus appellé danx cette Ville de Cadiz, pour voir un Neg.t francois nommé Mour. Charles Riviere lequel avoit une Carie vers le Milieu de la Machoire jnferieure du Côté gauche, quil me dit etre la Suitte de Lextraction dune dent molere quil setoit fait arracher á S.t Malo six moix auparavant au retour d'un Voyage de la chine,

Les premiers jours aprés l'avoir bien examiné et reconnu je touchay la ditte Carie avec la dissolution de mercure et apliqué le Beaume du Commandeur, et la teinture de Mirre, quelquex jours aprés je m'aperceus qu'elle s'etendoit de plus en plus et que toutes les grosses dents branloit ce qui me determina de les faire arracher ce qu'etant executé je découvrix une plus grande etendüe de Carie d'ou jl exhaloit une puanteur jnsuportable, j'apliquay sur toute la Carie aparente le Beaume du Commandeur et la teinture Calternative pendant quelquex jours, Cepend.t la Carie fesoit toujours plux de progrés et les Jensives se separoient de la machoire á veüe d'oeil, ce qui m'obligea d'y porter le cotere-atuel lequel ne püt arretter le progrés, et elle Continua jusqu'a ce que toute la Substance Jeut Cariée depuix la Simphise jusqu'a son Condille et Coroné et vers son millieu totallement vermoulüe qui etoit le point ou avoit Commencé la Carie et ayant entierement perdu son point d'apuy la Contration du maçater et du Crotafite eleverent la partie posterieure laquelle seleva considerablem.t ce qui l'empechoit de pouvoir faire la mastigation et d'avaler et de pouvoir articuler les parolles avec

8

Liberté voyant cela je Saisis Lextremitté elevée avec mes
pinces et m'apperçeus que le tout Vaciloit jusques au
Condille, ce que voyant je Fus chercher le Becqacorbins
lequel me parût Linstrument le plus propre pour Saisir
Los et avec lequel je pouvois Faire le plus de Force —
l'ayant Donc Saisy en Faisant un petit effort en tirant
á moy la machoire Suivit jusqu'á Son Condille et
Coroné exclusivement du Cartilage qui le revet lad.—
Carice Setoit prolongée jusques á eux ce qui Se reconnut
par la Couleur et Locteur, je Fis oter les Dents de la
partie anterieure lesquelles etoient branlantes jusques
á la Simphise peu de jours aprés jl Se Forma un accés
á la partie jnferieure et enterieure lequel jouvrit á
Lextremitte de la machoire qui repondoit á la Simphise
du menton, Los de la piece enterieure Se presenta á Louverture laquelle je Saisis
avec mes pinces laquelle Suivit, ayant laissé l'autre
Coté de la machoire entierement libre de toute —
alteration et Lulcere Se Citatrisa par les voyes les
plus Simples, et les plus ordinaires, en moins de
quinze jours l'autre Côté de machoire á Continué de
Faire ses fonctions de mastication Comme á Lordinaire
jl á resté du Côté ou manque la machoire un —
enfoncement lequel jl á Soin de Couvrir avec Sa
perruque, jl á resté jcy plus de quatre ans aprés la
guerison et ma dit quil pouvoit bien boire et
manger faisant bien la mastigation du Côté qui ne
feut pas endommagé ayant la Liberté d'ouvrir et
fermer la machoire et Se portant le mieux du monde,
le coté ou manque la machoire obeit au mouvement
les fibres Setant endurcies. lequel est retourné á
La Chine Jean Lacombe Chirurgien major de la Marine